
¿Qué es la Tuberculosis?

La tuberculosis (TB) es una enfermedad prevenible y curable, producida por una bacteria llamada Bacilo de Koch. Puede llegar a ser mortal sin diagnóstico y tratamiento oportuno.

La enfermedad compromete principalmente los pulmones, pero puede también afectar otros órganos como cerebro, riñones, ganglios, etc.



La multiplicación de la bacteria produce la destrucción del tejido pulmonar convirtiendo al enfermo sin tratamiento en una fuente de contagio.

¿Cuales son los Síntomas?

- La TOS es el síntoma más frecuente y se presenta en la mayoría de los casos.
- Puede ser TOS seca o con flemas por mas de 15 días.



Otros síntomas pueden ser: falta de apetito, decaimiento, fiebre, sudoración nocturna, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, pérdida de peso, debilidad y malestar general.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

Cuando un enfermo sin tratamiento TOSE o ESTORNUDA expulsa al medio ambiente miles de gotitas de saliva que contiene las bacterias que pueden ser inhaladas por personas sanas. Algunas de estas personas pueden posteriormente enfermar.

¿Quienes se Enferman?

- Cualquier persona puede enfermar de Tuberculosis, pero algunas tienen mayor riesgo, entre ellas las que están en estado de desnutrición o con bajas defensas.
- También tienen alto riesgo de enfermar de TB, las personas con VIH/SIDA, los alcohólicos, los farmacodependientes y quienes viven en condiciones de hacinamiento.

¿Cómo saber si tengo Tuberculosis?

- Ante cualquiera de los síntomas debe consultar de inmediato. El médico le ordenará un examen llamado BACILOSCOPIA de esputo, que consiste en analizar en el laboratorio 3 muestras de su expectoración o flema.
- En algunos casos el diagnóstico de la tuberculosis pueden requerir de exámenes adicionales como radiografía de tórax.



¿Tiene tratamiento la Tuberculosis?

Sí, existen medicamentos efectivos que y debe ser SUPERVISADO diariamente permiten la completa curación del paciente. El tratamiento es GRATUITO por el personal de salud. El tratamiento es ambulatorio y tiene una duración de seis meses. Durante PANUELO DESECHABLE AL ESTORNUDAR O TOSER, O TAPAR este tiempo NO es necesario aislar al paciente. La recomendación útil es EL BOCA Y NARIZ CON EL ANTEBRAZO, NUNCA CON LA MANO.

medidas de prevención? ¿Cuales son las

Vacunar con BCG a todo recién nacido.


acceso de luz solar y buena higiene. Mantener la vivienda ventilada, con

Procurar una alimentación balanceada.





Centro de Salud u Hospital Ante cualquier duda consulte en su IPS, más cercano



Salud Secretaria de

Programa de Tuberculosis Unidad Epidemiología Centro Administrativo Municipal www.manizalessalud.com Calle 19 No. 21 - 44 887 970 Ext. 71410 Forre B Piso 4





Assbasalud



Secretaria de